

OilSTART^{NG}

FERTEQ



EO TOP – ТЕЧНА СМЕС НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ БОР (В, ЕТАНОЛАМИН)
И МОЛИБДЕН (Мо, АМОНИЙ)

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE – AMESTEC LICHID DE ÎNGRĂȘĂMINTE CU OLIGOELEMENTE
(BOR, MOLIBDEN)

E.2.4.1

Състав	Elemente	Концентрация (% маса) Concentrație (% masa)	Обем Volum
Водоразтворим бор (В)	Bor solubil în apă (В)	1,79 %	25 g/l
Водоразтворим молибден (Мо)	Molibden solubil în apă (Мо)	0,214 %	3 g/l



BG

RO

13,85 kg

10 L

ВЪЗНМАНИЕ

H315 Предизвиква дразнене на кожата. P102 Да се съхранява извън обсега на децата. P264 Измийте ръцете си старателно след употреба. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P301 + P312 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с сапун и вода. P332 + P313 При повреда на кожата дразнене: Потърсете медицинско съвет/помощ. P501 Съдържанието/опаковката да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. Предпазете съдържанието/опаковката в одобрен за целта събирателен пункт.

Състав: сярка (CAS: 7704-34-9), магнезиев хидроксид (CAS: 1309-42-8), сулфонатен ароматен полимер, натриева сол, реакционна маса на 2-метил-5-хлоро-2н-изотиазол-3-он (3:1) (CAS: 55965-84-9)

Състав	Концентрация (% маса)	Съдържание (г/л)
Азот (N) Общ	1,79 %	25 g/l
Магнезий (MgO) водоразтворим	2,14 %	30 g/l
Обща сярка (SO ₂) (водоразтворима 6%)	71 %	990 g/l
Бор (B) водоразтворим	1,79 %	25 g/l
Молибден (Mo) водоразтворим	0,21 %	3 g/l

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА:

Вид култура	Дози	Период на приложение
Рпаица	0,5 л/дка – Максимална концентрация: 3 %	1 – 2 пъти от 2 – 3-ти лист до началото на цъфтежа
Слънчоглед	0,5 л/дка – Максимална концентрация: 3 %	2 пъти – във фаза 5-та двойка листа и във фаза преди цъфтеж
Цвекло	0,5 л/дка – Максимална концентрация: 3 %	2 пъти в начален период от добре развита листна маса
Други култури*	0,5 л/дка – Максимална концентрация: 3 %	1 – 2 пъти при добре развита листна маса

*За защитни култури се препоръчва да направите първоначален тест при концентрация от 2,5% и да наблюдавате реакцията на растението.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА: За най-добри резултати използвайте достатъчно вода, за да постигнете равномерно покритие на цялата култура без изтичане. Избягвайте прилагане при силна слънчева светлина или много висока температура. При възможност използвайте вечер или рано сутрин, особено ако температурите през деня надвишават 26°C. Вижте частта "Препоръки за културите" на този етикет за доза и период на приложение при различни култури.

ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА: 1. Напълнете резервоара за пръскане с половината от посоченото количество вода и започнете да бъркате. 2. Разклатете добре опаковката преди откритие и добавете необходимото количество от този продукт, след което добавете останалото количество вода, като не спирате да бъркате. При смесване с други компоненти в резервоара, винаги добавяйте този продукт след препаратите на прах. Не оставяте сместа без бъркане. 3. След пръскане, почистете и изпалнете старателно ередрето.

СМЕСИОСЪТ: OISTAR NG е съвместим с повечето фунгициди и инсектициди. Първо разбъркайте продуктите за растителна защита и след това добавете OISTAR NG (в случая на СЛ формулация променете реда). Препоръчва се да се извърши тест за съвместимост преди първата употреба. (В случай на комбинация с други листни торове, препоръчваме да се консултирате с вашия производител).

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта само в оригиналната опаковка, плътно затворена, без да бъде излагана на директна слънчева светлина, и на безопасно разстояние от деца, животни и хранителни продукти. Пазете продукта от замръзване.

ОБЗЯВКЕДАНЕ НА ОПАКЪЦИТЕ: Извършването на опацките трябва да се извършва съгласно официалните нормативни изисквания. Не изхвърляйте в канализация или в околната среда. Отстранете опацките в съответствие с местните и/или националните предписания.

ГАРАНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ: Производителят и доставчикът на този продукт гарантират съдържанието на специфичните активни вещества в рамките на приемлива толеранс по време на опаковането. Нима гаранция за качеството и да е след, свързана с употребата на този тор. Възможните рискове, свързани с неправилно съхранение, бораване и употреба, са отговорност на потребителя.

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ (при възможност покажете етикета). Първа помощ при вдъшване: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставяте в позиция, улесняваща дишането. Първа помощ при контакт с кожата: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с сапун и вода. Първа помощ при контакт с очите: Промийте очите с чиста вода. Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Сваляте контактите леко, ако има таква и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Първа помощ при поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЛЕЧЕБ

Първо лечение: Преди прием на лекарствени продукти информирайте лекарука лекар за продукта, с който в работил постардате и мерките за първа помощ. При необходимост, вземете допълнителни мерки за осигуряване на първа помощ (и евентуално последващо лечение). При спешни случаи се обърнете към „Клиника по Токсикология“ към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ на тел: +359 2 9154 233 / +359 2 9154 405.

ОТРАНЕНО САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

ДАТА НА ИЗДАВАНЕТО: вик опаковката
Партиден номер: вик опаковката
Вносител: СЪУФЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД ул. "Полизна" №37, ет.4, 1303 София,
Email: agro_bulgaria@sofnet.com
Производител: AGRONUTRITION Parc Actevestre-3 av de l'Orchidee, 31390 CARBONNE, France

АТЕНЦЕ!

H315 Провоца иритация на пели. P102 А ну се лсаа в индемана копилор. P264 Splai-v mlaile dupa utilizare. P280 Purtați mănuși de protecție/mbrăcăminte de protecție/echipament de protecția ochilor/echipament de protecția feței. P302 + P352 ІN CAZ DE CONTACT CU PIELE: A spalați cu apă și săpun. P332 + P313 При повреда на кожата дразнене: Амбасежа/сонтинутул се vor colecta la un centru autorizat.

Substanțe periculoase: sulf (CAS: 7704-34-9), hidroxid de magneziu (CAS: 1309-42-8), полимер sulfonat aromatic, sare de sodiu, masă de reacție compusă din 5-loro-2-metil-2n-izotiazol-3-on(3:1) (CAS: 55965-84-9)

Elemente	Concentrație (% masa)	Сонтинутул de nutrienți
Азот (N) total	1,79 %	25 g/l
Магнезиу (MgO) solubil în apă	2,14 %	30 g/l
Sulf (SO ₂) total (solubil în apă 6 %)	71 %	990 g/l
Bor (B) solubil în apă	1,79 %	25 g/l
Moлибден (Mo) solubil în apă	0,21 %	3 g/l

DOZARE RECOMANDATA:

Culturi principale	Doze	Data aplicare
Rpaица	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	1 – 2 aplicări în stadiul de 2/3 frunze până la începutul înfloririi
Sfeca de zahăr	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	2 aplicări: în perioada cuprinsă între apariție – aparat floral bine dezvoltat
Floarea soarelui	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	2 aplicări în perioada cuprinsă între stadiul 5 perchi de frunze – începutul înfloririi
Alte culturi*	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	1 – 2 aplicări pe aparat floral foarte bine dezvoltat

*При култури протектае, ва trebui efectuat un test preliminar la concentrația de 2,5% și observată reacția plantei.

SFATURI PRACTICE DE UTILIZARE: Pentru cele mai bune rezultate, utilizați suficient de multă apă pentru a obține o acoperire buna a culturii. Evitați pulverizarea la temperaturi foarte ridicate și/ sau în timpul unei secete. Dacă este posibil, aplicați pe timp de seară sau dimineața devreme, в special dacă temperaturile din timpul zilei depășesc 28°C. Urmați recomandările la aplicare sau citiți și dozele și периода de aplicare pentru fiecare cultură в parte.

PREGĂTIREA SOLUЦИЕI: 1. Umpleți rezervorul pulverizatorului cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. 2. Aгitați recipientul foarte bine înainte de deschidere și adăugați cantitatea necesară de OISTAR NG, apoi adăugați restul de apă agitată идин раз. Când combinate! OISTAR NG cu alte componente в резервуару pulverizatorului, adăugați întotdeauna OISTAR NG cu ultimul курс. Мешинате агитатору в funcțiune. 3. După pulverizare, curățați și splai-v cu apă abundentă echipamentul.

COMPATIBILITATE: OISTAR NG este miscibil cu fungicidelor și insecticidelor utilizate в mod obișnuit. Mai întâi amestecați produsele de protecție а plantelor și apoi adăugați OISTAR NG (в cazul formulării SL modificată ordine). În orice caz, vă recomandăm să efectuați un test de miscibilitate înainte de prima utilizare. În cazul combinațiilor cu alte îngrășămintе foliare, vă recomandăm să consultați producătorii acestora.

CONDII DE DEPOZITARE: А се păstra в recipiente opacitate, bine închise, într-un loc bine ventilat și răcoros. Nu măncați, nu beți și nu fumați в zonele в care produsul este depozitat și utilizat. А ну се păstra împreună cu alimente și furaje. А се păstra departe de sursele de căldură.

SFATURI PENTRU DISTRUGEREA RECIPIENTULUI: Eliminați deșeurile в conformitate cu Legea privind deșeurile. Transferați într-un container adecvat și solicitați colectarea deșeurilor de către o companie specializată в eliminarea deșeurilor.

GARANTEE și RESPONSABILITATE: Producătorul și furnizorul acestor produse garantează сонтинутул anumitor substanțe active într-o toleranță acceptabilă в timpul ambalării. Nu există nicio garanție de niciun fel legata de utilizarea acestui îngrășămint. Posibilele riscuri asociate stocării, manipulării și utilizării încearcе sunt responsabilitatea utilizatorului.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: În mod general, în caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați fără rezerve un medic. În caz de expunere prin inhalare: Іn caz de manifestare alergice, consultați un medic. Іn caz de împrescare sau de contact cu pielea: Dezbrăcați hainele impregnate și consultați un medic. Іn caz de apă și săpun sau utilizați un agent de curățare cunoscut. Aveți grijă la produsul care poate rămâne între pielea și haine, carne, încălțăminte, etc. Іn caz de manifestare alergică, consultați un medic. Atunci când zona contaminată este întinsă și/sau apar leziuni ale pielii, este necesar să consultați un medic sau să faceți transferul la spital. Іn caz de înghițire: Nu dați nimic de absorbit pe cale bucală. Dacă cantitatea nu este importantă, (nu mai mult de o înghițitură), otăiați gura cu apă și consultați un medic. Chemati imediat un medic și arătați-i eticheta. Înainte de un tratament medical: Înainte de un tratament medical, informați medicalul dvs. referitor la produsul cu care а lucrat victima și referitor la primul ajutor. Dacă este necesar, aplicați măsuri suplimentare pentru а spira primul ajutor și (eventual un tratament ulterior), consultați Центру de Informare Toxicologică: Institutul de Sănătate publică București, telefon: +40 21318 36 20, interior 233.

DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL

Data fabricației: indicată pe ambalaj
Număr tel. indicat pe ambalaj
Producător: AGRONUTRITION

Parc Actevestre-3 av de l'Orchidee, 31390 CARBONNE, France
Importator: SC SOUFFLE AGRO ROMANIA SRL DN 28 km 9+900m, 12000 Buzau, Tel: +40 238 402 868

