



PFC1(C)(I)(b)(i): ОРГАНИЧЕН МИНЕРАЛЕН ТЕЧЕН ТОР

PFC1(C)(I)(b)(i): ÎNGRĂȘĂMÂNT LICHID MINERAL SIMPLU

Разтвор на тор с микроелементи N (MgO, SO₃) 1,79 (2,2-71)

Soluție de îngrășământ cu micronutrienți N (MgO, SO₃) 1,79 (2,2-71)

Състав	Elemente	Концентрация (% маса) Concentrație (% masa)	Съдържание Conținutul de nutrienți
Азот (N) Общ	Azot (N) total	1,79%	25 g/l
Уреинов азот	Azot ureic	1,5%	20 g/l
Магнезий (MgO) водоразтворим	Magneziu (MgO) solubil în apă	2,2%	30 g/l
Обща (SO ₃) водоразтворима	Sulf (SO ₃) solubil în apă	71 %	990 g/l
Бор (B) водоразтворим	Bor (B) solubil în apă	1,79%	25 g/l
Молибден (Mo) водоразтворим	Molibden (Mo) solubil în apă	0,21 %	3 g/l

ВГ ВНИМАНИЕ

H315 Преди извършване на кожата. **P102** Да се съхранява извън обсега на деца. **P264** Измийте ръцете си старателно след употреба. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P302 + P352** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. **P332 + P313** При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. **P501** Съдържанието/опаковката да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. Предайте съдържанието/опаковката в одобрен за целта събирателен пункт.

Състав: сара CAS: 7704-34-9 (CMC1*), Бро етаноламиин CAS: 26038-87-9 (CMC1*)

* CMC1*: Необработени вещества и смеси

Този тръб съдържа урея, която може да отделя амонiak и да окаже влияние върху качеството на въздуха. В зависимост от местните условия трябва да се предприемат допълнителни мерки за възстановяване

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА:

Вид култура	Дози	Период на приложение
Рапица	0,5 л (два – Максимална концентрация: 3%	1 – 2 пъти от 2 – 3-ти лист до началото на цъфтене
Слънчоглед	0,5 л (два – Максимална концентрация: 3%	2 пъти – във фаза 5-та двойна листа и във фаза преди цъфтене
Цвекло	0,5 л (два – Максимална концентрация: 3%	2 пъти в начален период от добре развита листна маса
Други култури*	0,5 л (два – Максимална концентрация: 3%	1 – 2 пъти при добре развита листна маса

*За защитени култури се препоръчва да направите първоначален тест при концентрация от 2,5% и да наблюдавате реакцията на растението. Да се използва само в случай на нужда. Не превишавайте дозата за приложение.

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА: За най-добри резултати използвайте достатъчно вода, да за постигнете равномерно покритие на цялата култура без изтичане. Избягвайте прилагане при силна слънчева светлина или много високи температури. При възможност използвайте вечер или рано сутрин, особено ако температурите през деня надвишават 28°C. Вижте частта „Препоръки за културите“ на този етикет за доза и период на приложение при различните култури.

ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА: 1. Напълнете резервоара за пръскане с половината от посоченото количество вода и започнете да бъркате. 2. Разклатете добре опаковката преди отваряне и добавете необходимото количество от този продукт, след което добавете останалото количество вода, като не смъртате да бъркате. При смесване с други компоненти в резервоара, винаги добавяйте този продукт след preparata на прах. Не оставяйте сместа без бъркане. 3. След пръскане, почистете и изплазнете старателно уредите.

СМЕСИОСЪТ: OI5TART NG е съвместим с повечето фунгициди и инсектициди. Пръво разбъркайте продуктите за растителна защита и след това добавете OI5TART NG (в случай на СЛ формулация променете мерките). Препоръчва се да се извърши тест за смесимост преди първата употреба. В случай на комбинация с други листни торове, препоръчваме да се консултирате с техните производители.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта само в оригиналната опаковка, плътно затворена, без да бъде излаган на директна слънчева светлина, и на безопасно разстояние от деца, животни и хранителни продукти. Плазете продукта от замръзване.

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАКЪЦИТЕ: Изхвърлянето на опадащите трябва да се извършва съгласно официалните нормативни изисквания. Не изхвърляйте в канализацията или в околната среда. Отстранете опадащите в съответствие с местните и / или националните предписания.

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ (при възможност покажете етикета). **Първа помощ при дразнене:** При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставяте в позиция, улесняваща дишането. **Първа помощ при контакт с кожата:** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. **Първа помощ при контакт с очите:** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Сваляте контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. **Първа помощ при поглъщане:** НЕ предизвиквайте повърхване. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯТА на лекар.

Преди лечение: Преди прием на лекарствени продукти информирайте левация лекар за продукта, с който в работил пострадалия и мерките за първа помощ. При необходимост, вземете допълнителни мерки за осигуряване на първа помощ (и евентуално последващо лечение). При спешни случаи се обадете към „Клиника по Токсикология“ към УМБАЛ „С.И. Пирогов“ на тел: +359 2 9154 233 / +359 2 9154 409.

ОГРАНИЧЕНО САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Дата на производство: виж опаковката

Партиден номер: виж опаковката

Вносител: СУЙЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД ул. „Поизанто“ №37, ет.4, 1303 София,

Email: agro_bulgaria@soufflet.com

Производител: AGRONUTRITION Parc Actievstre-3 av de l'Orchidee, 31390 CARBONNE, France

RO ATENȚIE

H315 Провоacă iritarea pielii. **P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P264** Spălați-vă mâinile după utilizare. **P280** Purtați mănuși de protecție/mbrăncămițe de protecție/echipament de protecție ochilor/echipament de protecția feței. **P302 + P352** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. **P332 + P313** În caz de iritare a pielii: consultați medicul. **P501** Eliminați conținutul/receptiul conform regulilor locale/regionale/nazionale/interstate. Ambalajele/conținutul se vor colecta la un centru autorizat.

Substanțe periculoase: sulf CAS: 7704-34-9 (CMC1*), bro etanolamiin CAS: 26038-87-9 (CMC1*)

CMC1: Substanțe și amestecuri de materiale vierme

Acces îngrășământ conține uree, care poate elibera amoniac și poate avea un impact asupra calității aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere corespunzătoare.

DOZARE RECOMANDATĂ:

Culturi principale	Doze	Dată aplicare
Rapiță	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	1 – 2 aplicări din stadiul de 2/3 frunze până la începutul înfloririi
Steclă de zahăr	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	2 aplicări: în perioada cuprinsă între apariție – aparat foliar bine dezvoltat
Floarea soarelui	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	2 aplicări în perioada cuprinsă între stadiul 5 perchi de frunze – începutul înfloririi
Alte culturi*	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	1 – 2 aplicări pe aparat foliar foarte bine dezvoltat

*Pentru culturi protejate, va trebui efectuat un test preliminar la concentrația de 2,5% și observată reacția plantei. A se utiliza numai în caz de necesitate recunoscută. Nu depuși rata de aplicare.

SFATURI PRACTICE DE UTILIZARE: Pentru cele mai bune rezultate, utilizați suficient de multă apă pentru a obține o acoperire buna a culturii. Evitați pulverizarea la temperaturi foarte ridicate și / sau în lumina puternică a soarelui. Dacă este posibil, aplicați pe timp de seară sau dimineața devreme, în special dacă temperaturile din timpul zilei depășesc 28°C. Urmați recomandările la aplicare precum și dozele și perioada de aplicare pentru fiecare cultură în parte.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI: 1. Umpleți rezervorul pulverizatorului cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați. 2. Agitați recipientul foarte bine înainte de deschidere și adăugați cantitatea necesară de OI5TART NG, apoi adăugați restul de apă agitată constant. Când combinați OI5TART NG cu alte componente în rezervorul pulverizatorului, adăugați întotdeauna OI5TART NG ca ultim produs. Mențineți agitatorul în funcțiune. 3. După pulverizare, curățați și spălați cu apă din abundență echipamentul.

COMPATIBILITATE: OI5TART NG este miscibil cu fungicidele și insecticidele utilizate în mod obișnuit. Mai întâi amestecați produsele de protecție a plantelor și apoi adăugați OI5TART NG (în cazul formulării SL modificată ordinea). În orice caz, vă recomandăm să efectuați un test de miscibilitate înainte de prima utilizare. În cazul combinațiilor cu alte îngrășăminte foliare, vă recomandăm să consultați producătorii acestora.

CONDITII DE DEPOZITARE: A se păstra în recipiente originale, bine închise, într-un loc bine ventilat și răcoros. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în zonele în care produsul este depozitat și utilizat. A nu se păstra împreună cu alimente și furaje. A se păstra departe de sursele de căldură.

SFATURI PENTRU DISTRIBUȚIA RECIPIENTULUI: Eliminați deșeurile în conformitate cu Legea privind deșeurile. Transferați într-un container adecvat și solicitați colectarea deșeurilor de către o companie specializată în eliminarea deșeurilor.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: În mod general, în caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați fără rezerve un medic. **În caz de expunere prin inhalare:** În caz de manifestare alergică, consultați un medic. **În caz de îngrășare sau de contact cu pielea:** Dezbrăcați hainele impregnate și spălați cu grijă pielea cu apă și săpun sau utilizați un agent de curățare cunoscut. Aveți grijă la produsul care poate rămâne între pielea și haine, ecze, încălțăminte, etc. În caz de manifestare alergică, consultați un medic. Atunci când zona contaminată este întinsă și/sau are leziuni ale pielii, este necesar să consultați un medic sau să faceți transferul la spital. **În caz de inghițire:** Nu dați nimic de absorbit pe cale bucală. Dacă cantitatea nu este importantă, (nu mai mult de o inghițitură), clătiți gura cu apă și consultați un medic. Chemati imediat un medic și arătați eticheta. **Înaintea de un tratament medical:** Înainte de un tratament medical, informați medicul dvs. referitor la produsul care a curat vracita și referitor la primul ajutor. Dacă este necesar, aplicați măsuri suplimentare pentru a asigura primul ajutor (și eventual un tratament ulterior), consultați **Centrul de Informare Toxicologică: Institutul de Sănătate publică București, telefon: +40 21318 36 20, interior 235.**

DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL

Data fabricației: indicată pe ambalaj

Numar lot: indicat pe ambalaj

Producător: AGRONUTRITION

Parc Actievstre-3 av de l'Orchidee, 31390 CARBONNE, France

Importator: SOUFFLET AGR0 ROMANIA SRL DN 28 km

9+900m, 120000 Buzau, Tel. +40 238 402 868

