



ALTERNARIA



SCLEROTINIA



RUGINA



FUZARIOZA

REGULATOR
DE CREȘTERE

STARPRO

FUNGICID CU CONCENTRAȚIE RIDICATĂ
CU SPECTRU DE UTILIZARE ÎNDELUNGATĂ

STARPRO este un fungicid sistemic activ ce conține tebuconazol ca substanță activă. Are o acțiune eficientă cu rol preventiv, curativ și eradicativ, împotriva unei game largi de boli fungice semnificative din punct de vedere economic, pentru boli la rapiță și cereale. Are o activitate pe termen lung.

AVANTAJE

Substanța activă:

- ▶ fungicid cu spectru larg pentru protecția cerealelor și rapiței
- ▶ specialist în fuzarioza spicului
- ▶ efect de fungicid și regulator de creștere pentru rapiță
- ▶ eficacitate pe termen lung după aplicare
- ▶ flexibil în utilizare

Formulare inovativă SC:

- ▶ prietenos în amestecarea cu alte pesticide
- ▶ concentrație ridicată, mai multe hectare cu mai puțini litri
- ▶ mai puțin volum pentru decantare în pulverizator, timpi de umplere mai rapizi
- ▶ cu până la 70% mai puține deșeuri de ambalaje pentru distrugere

EFFECTUL SPECTRULUI

- ▶ **Tebuconazol** este preluat de frunzele și tulpina plantei, apoi este distribuit sistemic prin fluxul de transpirație în întreaga plantă. Inhibă biosinteza ergosterolului în două etape ale metabolismului. Se recomandă să nu se micșoreze doza și utilizați întotdeauna tebuconazol cu un asociat pentru a evita crearea rezistențelor.
- ▶ **Pentru cereale**, asigură protecția împotriva fusariozelor și ruginii spicului, cu efecte secundare împotriva mușgaiului pulverulent, pata brună (DTR), pete de rhychosporium.
- ▶ **Pentru rapiță**, asigură protecția împotriva Sclerotiniei cu efecte secundare semnificative asupra cilindrosporiozelor și Alternaria. Are, de asemenea, o eficacitate morfo-regulatoare la aplicare toamna și primăvara.

Substanța activă: tebuconazol 430 g/l

Formulă: concentrat de suspensie (SC)

Ambalaj: 5 l




Rapiță – alternaria



Rapiță – sclerotinia




Grâu – fuzarioza spicului



Grâu – Rugina galbenă

Tebuconazol 250 EW comparat cu STARPRO



Cultură	Eficacitate asupra bolilor	Doza l/ha	Data pentru aplicare
Rapiță	Putregai Negru (Phoma lingam) Alternarioza (Alternaria spp) Putregai Cenușiu(Botrytis spp) Regulator de creștere	0.45	Toamna 4-8 frunze (BBCH 14-BBCH 18)
		0.6	Primăvara- creșterea tulpinii (BBCH 30-BBCH 39)
	Putregai alb (Sclerotinia Sclerotiorum) Alternarioza (Alternaria spp) Putregai Cenușiu(Botrytis spp)	0.75	Primăvara la înflorire (BBCH 65-BBCH 69)
Grâu	Rugina brună(Puccinia recondita) Făinarea (Blumeria graminis) Septorioza(Septoria tritici) Helmintosporioza (Pyrenophora tritici-repensis)	0.6	Până la apariția frunzei standard (BBCH 30-BBCH 39)
	Rugina brună(Puccinia recondita) Făinarea (Blumeria graminis) Septorioza(Septoria tritici) Septorioza spicelor (Phaeosphaeria nodorum) Fuzarioza(Fusarium spp)	0.6	Apariția spicului până la începutul înfloritului (BBCH 51-BBCH 61)
Orz	Rugina (Puccinia hordei) Făinarea (Blumeria graminis) Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) Pătarea reticulară (Pyrenophora teres)	0.6	Final de înfrățire până la al doilea internod (BBCH 29-BBCH 32)
	Rugina (Puccinia hordei) Făinarea (Blumeria graminis) Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) Pătarea reticulară (Pyrenophora teres)	0.6	Apariția spicului până la începutul înfloritului (BBCH 51-BBCH 61)

Utilizați produsele de protecție a plantelor în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Citiți frazele de siguranță și simbolurile de pe etichetă. Produsul poate fi utilizat numai de către un profesionist.