

- Gândacul Bălos  
(*Lema melanopa*)

AGRO FLASH nr. 13/2024

## Gândacul Bălos (*Lema melanopa*)

**Gândacul bălos** este prezent în toate zonele țării, atacă graminee spontane și cultivate (ovăz, grâu, orz și secară).

### Descriere dăunător:

Adultul are o lungime de 4-4,8 mm, are o culoare albastruie cu reflexe metalice, tarsele, capul și antenele sunt de culoare neagră iar tibiile, pronotul și femurele de culoare roscată.



Larva este oligopodă și are o lungime de 5-7 mm.



Iernează ca adult sub resturi vegetale, primăvara (aprilie), apar când temperatura medie este de 9-10 grade. Prin hrănire perforază frunzele sub formă de dungi longitudinale.

Ouăle sunt depuse pe partea superioară a frunzei la începutul lunii mai și

după două săptămâni apar larvele care se hrănesc cu limbul foliar.




### Efectele atacului:

Randamentul de producție al culturii poate fi afectat dacă insecta nu este controlată, pierderile pot să fie până la 60 % , larvele pot transmite și virusuri.

**NOCIVITATE**

**FRECVENTĂ**



### RECOMANDARE

**Soufflet Agro România:**

**Măsuri agrotehnice:**

Respectarea rotației culturilor și aplicarea tratamentelor cu insecticide în momentul optim.

**Insecticide:**

**-VANTEX 60 CS**

(gamma cihalotrin 60 g/l) – 50 - 80 ml/ha

**- KARATE ZEON**

( Lambda - Cihalotrin 50 g/l) - 0,15l/ha

**- LAMDEX EXTRA**

(25 g/kg Lambda-cihalotrin) -0,3 kg/ha