

# PACHETUL BANDERA DANEVA

SOLUȚIA COMPLETĂ DE ERBICIDARE  
PENTRU PORUMBUL TĂU!

## BANDERA

BANDERA este un erbicid cu spectru de combatere a buruienilor monocotiledonate optimizat prin formularea OD (suspensie concentrată uleioasă, care garantează o penetrare mai bună în plantă, pentru o eficiență mai rapidă), care oferă acțiuni suplimentare împotriva buruienilor dicocotiledonate.

**Compoziție:** nicosulfuron 40 g/l  
**Formulare:** ulei dispersabil (OD)

## DANEVA

Erbicid pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene și unele monocotiledonate anuale la cultura de porumb. Formularea sa calitativă de concentrat de suspensie împreună cu un adjuvant suplimentar asigură un nivel ridicat de eficiență. Modul său triplu de acțiune (foliar, la rădăcini și anti-germinativ) asigură o regularitate ridicată de eficacitate pe buruienile importante.

**Compoziție:** mesotrione 100 g/l  
**Formulare:** suspensie concentrată (SC)

### AVANTAJE

- ▶ Complementaritate ridicată a modului de acțiune a celor 2 produse, BANDERA (HRAC B) + DANEVA (HRAC F2) permite un nivel foarte ridicat de eficiență și o acțiune prelungită atât împotriva monocotiledonatelor cât și împotriva principalelor buruieni dicotiledonate din porumb.
- ▶ Soluție adaptată tuturor strategiilor de combatere a buruienilor de la stadiul 3 până la stadiul de 10 frunze, la porumb.
- ▶ Permite un control eficient timpuriu al buruienilor încă din stadiile incipiente la porumb (stadiul de 3-4 frunze).
- ▶ Formulările de calitate premium ale BANDERA (OD) și DANEVA (SC) permit o amestecare perfectă și o eficiență ridicată.

### MOD DE ACȚIUNE

Pachetul BANDERA + DANEVA este un post-emergent, împotriva monocotiledonatelor și buruienilor dicotiledonate, compus din două substanțe sistemice active cu moduri diferite de acțiune:

- ▶ mesotrione (grup HRAC F2) din familia calistemonelor. Se transferă rapid în plantă prin intermediul frunzelor și al rădăcinilor. Fotosinteza este perturbată și acțiunea sa asupra clorofilei provoacă albirea și apoi distrugerea buruienilor.
- ▶ nicosulfuronul (grupa HRAC B), acționează esențial pe cale foliară. Acesta determină oprirea imediată a creșterii și apoi dispariția buruienilor sensibile ce erau deja apărute.

DANEVA (Nicosulfuron 40 g/l)	CULTURA	DOZA L/HA	NORMA DE APĂ/HA	PERIOADA DE APLICARE	BURUIENI COMBĂTUTE
	Porumb	1-1,2	200-300	BBCH 12-18	Monocotiledonate anuale
	Porumb	1,2	200-300	BBCH 12-18	Costreii din rizomi
BANDERA (Mesotrione 100 g/l)	CULTURA	DOZA L/HA	NORMA DE APĂ/HA	PERIOADA DE APLICARE	BURUIENI COMBĂTUTE
	Porumb	1	200-300	BBCH 12-18	Dicotiledonate anuale și perene